

Ueber

Lane Medical Library

aries der Wirbelsäule.

1867

Medicinische Inaugural-Dissertation

mit Genehmigung

der medicinischen Facultaet

der vereinigten Friedrichs-Universitaet

Halle - Wittenberg

zur Erlangung der Doctorwürde

in der Medicin und Chirurgie

zugleich mit den Thesen öffentlich vertheidigt

am

20. December 1867 — Vormittags 11 Uhr

von

Heinrich Kraus

aus Hoexter in Westfalen

gegen

Max Kersten, Dr. med.

Adolph Linstaedt, Dr. med.

Mit einer Steindrucktafel.

Halle,

Druck von W. Plötz.

Vertrag über die Vertheilung

des Reichthums der Natur

von

dem Reichthum der Natur

der Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

der Reichthum der Natur

in der Natur der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Reichthum der Natur

Seiner lieben Mutter

aus Dankbarkeit

gewidmet.

Der Verfasser.

Die Entzündung der Wirbel ist eine häufige Erkrankung, die sich hauptsächlich an den Rücken- und Lendenwirbeln, indess an allen übrigen Wirbeln entwickeln kann, und sich vor der Entzündung anderer Knochen dadurch hinreichend auszeichnet, dass durch die unmittelbare Nähe des Markes und der aus diesem entspringenden Nerven sie mit in den Krankheitsprozess verwickelt und so die Erscheinungen der Knochenentzündung von den Erscheinungen der in Mitleidenschaft gezogenen Nerven begleitet werden.

Die primäre Entzündung kann je nach ihrem Charakter und Sitze und je nach verschiedenen ausserhalb und innerhalb des Körpers begründeten Ursachen in Heilung oder in verschiedene Folgezustände wie Caries oder Nekrose übergehen.

Der häufigste und gefährlichste Ausgang der Wirbelentzündung ist Caries mit ihren Folgezuständen, von denen wir hier nur die hauptsächlichsten: die Kyphose und den Conusabscess hervorheben wollen.

Die Neigung der primären Entzündung in Caries überzugehen ist nach der Art der Entzündung und nach den verschiedenen individuellen Verhältnissen sehr verschieden; im Allgemeinen ist bei dyscrasischen heruntergekommenen Individuen diese Neigung grösser als bei kräftigen gesunden.

Schon nach der verschiedenen anatomischen Beschaffenheit der Wirbel lässt sich annehmen, dass Charakter und Sitz der primären Entzündung verschiedener Art sein können, da an jedem Wirbel wahre Gelenke und Synchondrosen vorkommen, da jeder Wirbel aus fester und spongiöser Knochensubstanz besteht, so wird jeder dieser Theile eine primäre Sitz der Entzündung sein können und wird nach seiner anatomischen Beschaffenheit den Charak-

ter der Entzündung bestimmen. Diese Annahme wird auch durch die Verschiedenheit der Folgezustände und durch die grosse Verschiedenheit der Ursachen, welche Wirbelentzündung hervorrufen können, bestätigt, denn diese grosse Verschiedenheit der Ursachen findet ihre Erklärung nur darin, dass bei der Verschiedenheit der einzelnen Theile der Wirbel, auch verschiedene Entzündung bedingende Ursachen günstigen Boden finden.

Wegen der tiefen und unzugänglichen Lage der Wirbelsäule sind die primären Entzündungen schwer zu erkennen, desshalb ist es erklärlich, dass man früher nur die schweren Folgezustände erkannte und beschrieb, denn wenn man auch in neuerer Zeit, gestützt auf pathologisch anatomische Befunde und geleitet von analogen Entzündungen anderer Knochen die Symptome der primären Entzündungen genauer studirt hat, so lässt es sich jedoch gar nicht vermeiden, dass auch jetzt noch häufig genug diese übersehen und verkannt werden und die vorhergegangene primäre Entzündung erst aus den schwereren Folgezuständen richtig erkannt wird, besonders da gerade im Anfang die Erscheinungen der in Mitleidenschaft gezogenen Nerven die Erscheinungen der erkrankten Wirbel in den Hintergrund drängen.

Wenn wir vorläufig von der Entzündung des ersten und zweiten Halswirbels, auf die wir später zurückkommen absehen, weil bei diesen in allen Fällen ihrer eigenthümlichen Gelenkverbindung wegen die Erscheinungen der Gelenkentzündung mit ihren gerade an dieser Stelle eigenthümlichen Complicationen in den Vordergrund treten, so kann die Entzündung an folgenden Theilen entstehen:

An den wahren Gelenken, und hier kann sie wieder von der Synovialmembran oder von den Bändern ihren Ausgang nehmen.

Die Entzündung der Synovialmembran entsteht wie in den meisten Fällen, wie bei allen Synovialhauterkrankungen durch Erkältung. Der häufigste Sitz der Erkrankung sind die Gelenke der Hals- und Lendenwirbel. Die Symptome dieser Entzündung sind Schmerz bei Bewegung und Druck auf die betreffenden proc. obliq., ferner krampfhaft

strukturen der Muskeln an der leidenden Seite. Die Erscheinungen der mitleidenden Nerven dokumentiren sich durch Reissen im Verlaufe des plex. brachial. resp. des nerv. rad. und wegen dieser Complicationen ist die Verwechslung mit Muskelrheumatismus sehr leicht. Manchmal ändern diese Erkrankungen, wie das öfter bei den Erkrankungen der Synovialmembranen der Fall ist, von einer Stelle an andern.

Die Behandlung besteht in kräftiger Antiphlogose; nach verschwinden die Zufälle meistens, nur zuweilen bleiben leichte Verkrümmungen, öfter jedoch Neigung zu Flexionen zurück. Pathologisch anatomisch ist über diese der Wirbelentzündung noch nichts bekannt.

Ferner kann die Entzündung ausgehen von den Bändern der wahren Gelenke. Die gewöhnlichen Ursachen dieser Entzündung sind Erkältung oder Trauma. Sie dokumentirt sich durch eine schmerzhaftes Geschwulst an der betroffenen Stelle welche zu beiden Seiten der Dornfortsätze besonders deutlich, wenn die Erkrankung an den unteren Wirbeln sich befindet, zu fühlen ist, ferner durch Unbeweglichkeit der Wirbelsäule an dieser Stelle. Die Nervensymptome, welche dabei vorkommen, beschränken sich auf in einzelnen Fällen vorkommende ziehende Schmerzen in den Armen resp. Beinen. Die Ausgänge dieser Entzündung sind vollständige Heilung oder Ankylose oder partielle Luxation eines Wirbels, welche nach Stromeyer dadurch entsteht, dass sich durch die Anschwellung der Bänder und durch die Ansammlung von Synovia in den Gelenken der je obere Wirbel etwas um seine Axe dreht, wodurch der proc. spinos. aus der Reihe der übrigen tritt. Es entsteht dadurch leichte seitliche Verkrümmung, welche von uns durch die Kleider nicht zu bemerken ist, da sie durch Kompensationskrümmungen ausgeglichen wird. Diese Verkrümmung kann auch durch Erschlaffung der Bänder entstehen hat dann die Eigenthümlichkeit, dass sie sich durch Biegen nach der entgegengesetzten Seite völlig ausgleichen lässt.

Die Therapie, welche ebenfalls nur in einer kräftigen Antiphlogose besteht, ist nur so lange wirksam als Entzündung.

nung da ist, kann alsdann aber völlige Heilung bewirkt werden. Sind aber durch Vernachlässigung die eben beschriebenen Folgezustände eingetreten, so ist jede Therapie machtlos, nur bei Relaxation der Bänder kann vielleicht eine dauerhafte gezwungene Geradhaltung etwas bewirken.

Die Veränderungen, welche an den Wirbeln selbst bewirkt werden, sind knöcherne Verwachsung der Gelenkflächen mit osteophytischen Wucherungen in der Umgebung, wodurch die Zwischenwirbellöcher öfter verengt werden.

Neigung in ulcerirende Entzündung überzugehen haben diese eben beschriebenen Formen durchaus nicht; diesem Grunde, ferner wegen der unbedeutenden Symptome und ihres seltenen Vorkommens sind sie daher nur von untergeordneter Bedeutung.

In weit höherem Grade ist dies aber bei den Entzündungen der falschen Gelenke der Fall, welche von den Zwischenbandscheiben ihren Ausgang nehmen. Relativ häufig ist die primäre Entzündung der Zwischenbandscheiben allerdings wegen ihres geringen Reichthums an Blutgefäßen nicht, allein wichtig sind sie deshalb, weil sich die Entzündung meist auf die Wirbel überträgt und hier häufig ulcerirende Processe hervorruft.

Die Ursachen dieser Entzündungen sind auch meist Erkältung und Trauma, am häufigsten kommen sie von der Verbindung zwischen Kreuzbein und letzten Lendenwirbel, bei Frauen nach schweren Geburten; ebenso Entzündung der symphys. sacroiliaca; diese gehört eigentlich nicht her, dürfte aber doch wohl wegen Gleichartigkeit der Zwischenbandscheiben und dadurch bedingte öftere gleichzeitige Erkrankung mit der Zwischenbandscheibe zwischen Kreuzbein und letzten Lendenwirbel ferner wegen ihrer Beziehung zum Kreuzbein hier Erwähnung finden.

Am häufigsten beginnt die Entzündung an den Wirbeln selbst und hier sind wieder die centralen Entzündungen der Wirbelkörper am häufigsten und wichtigsten, da wegen der schwammigen Struktur dieser Theile die Entzündung sehr leicht einen ulcerativen Charakter annimmt.

weil aus demselben Grunde die Zerstörung sehr leicht
er um sich greift.

Es werden deshalb auch für gewöhnlich die Symptome
centralen Wirbelentzündung als die der Wirbelentzündung
allgemeinen beschrieben und die weniger häufigeren und
teren Formen finden keine weitere Beachtung.

Aber auch die peripherischen Theile des Wirbelkörpers
können der Sitz der Entzündung sein, gewöhnlich wird
dann durch Entzündung des Periosts oder des lig.
itud. ant. resp. post. eingeleitet. Dieselben bewirken
gewöhnlich tiefer greifende Exulcerationen, welche
meistens durch ihre grosse Schmerzhaftigkeit auszeich-
nen. Im Vergleich mit den centralen Entzündungen sind
sowohl diese auch diese nicht häufig.

An den Wirbelbögen, den proc. transvers. und spinos.
nimmt die Entzündung fast nie und schreitet auch eben so
selten von den Körpern auf diese fort; ja selbst, wenn
Körper mehrerer Wirbel gänzlich zerstört worden sind,
sind die Bögen nebst den genannten Fortsätzen fast im-
mer intakt. Dass hiervon Ausnahmen vorkommen können,
sehen wir später. Unter Umständen kann natürlich
auch die Entzündung zugleich von verschiedenen Punkten
ausgehen.

Die Ursachen sind bei Entzündung der Wirbelkör-
per auch wieder unter Umständen Trauma und Erkältung;
hat man häufiger nach Contusion durch Schüsse Caries
des Kreuzbeins beobachtet (Demme).

Am meisten sind aber wohl als zu Grunde liegende
Ursachen Scrophulose und Tuberculose hervorzuheben, nicht
wegen ihrer überwiegenden Häufigkeit, sondern auch,
daß die entstandene Entzündung in diesen Fällen als bei
scrophulösen Individuen weit grössere Neigung hat in Ca-
ries überzugehen.

Bei der leider so häufig bei Kindern vorkommenden
Osteomyelitis liegt in den überwiegend meisten Fällen Scro-
fulose zu Grunde, wenn auch sehr häufig ein Stoss oder
Fall als direkte Ursachen angegeben werden. In fast
allen diesen Fällen lassen sich entweder noch vorhandene
oder doch früher dagewesene Symptome der Scrophulose

nachweisen. Es kann dann wohl dies Trauma die Gelegenheitsursache gewesen sein, welche das Uebel hervorgerufen hat, oft genug aber kömmt das Uebel ohne solche Gelegenheitsursache zum Ausbruch, ein zufällig hinzugekommenes Trauma macht aber erst die Betreffenden darauf aufmerksam.

Seltener als Scrophulose liegt Tuberculose zu Grunde, die Tuberculose kann alsdann eine einfache Entzündung bewirken, welche gewöhnlich in Caries übergeht, oder es können wirkliche Tuberkelablagerungen in den Wirbeln stattfinden, welche zerfallen und so ulcerirende Processe herbeiführen. Im Leben lässt sich dies nicht unterscheiden, da die Symptome beider Processe sich nicht aus einander halten lassen und häufig genug beide Formen zusammen vorkommen.

Auch Syphilis kann in doppelter Weise der Grund der Wirbelentzündung sein: 1) kann die Entzündung die Folge der constitutionellen syphilitischen Erkrankung sein, 2) können auch in die Tiefe dringende syphilitische Rache Geschwüre periphere Ulceration der Halswirbel hervorrufen.

Auch in Folge von Mercurialismus hat man Wirbelentzündungen auftreten gesehen.

Von mehreren wird als eine hervorragende Ursache Onanie angesehen, indess ist dabei wohl die Ursache mit der Folge verwechselt. Wenn bei einer Wirbelentzündung Leiden häufig Onanie beobachtet wurde, so kann dieses durch den stärkeren Geschlechtsreiz verursacht sein, welcher sowohl durch den Reiz des alkalisch gewordenen Urins als durch die Geschlechtstheile, als durch Nervenreiz vom mit ergossenen Rückenmarke aus bewirkt wird. Ferner spricht auch dagegen, dass die häufigsten Erkrankungen bei kleinen Kindern vorkommen.

Was den Namen der Krankheit anbelangt, so belegte man früher dieselbe, mochte sie ausgehen von wo sie wollte, mit dem Namen Spondylarthrocace. Da dies indess die Erkrankung eines Gelenkes voraussetzt und doch, wie oben gesagt wurde, die meisten Erkrankungen von den Wirbelkörpern ausgehen, so beschränkte Herr Geheimrath Blas-

den Namen mit Recht auf die Entzündungen, welche entweder von den beiden oberen Halswirbeln oder den wahren oder falschen Gelenken der übrigen Wirbel ausgehen führte für die von den Körpern ausgehenden Entzündungen den Namen Spondylocace ein.

Ausserdem sind noch die Namen Malum Pottii und krummatische Cyphose im Gebrauch; ersterer rührt her von dem Engländer Percival Pott, welcher die Krankheit zuerst zuerst beschrieb, der letztere ist deshalb wohl zu verwerfen, weil derselbe besser für die Kyphose, welche durch Kellähmung entsteht, gebraucht werden kann.

Ueber das Vorkommen der Krankheit sind schon oben so fern Andeutungen gemacht worden, dass Scrophulose die häufigste Ursache ist, denn da die Scrophulose eine Leberkrankheit ist, so liegt schon in diesen Worten, dass diese Krankheit hauptsächlich im Kindesalter vorkommen. Aber auch abgesehen von der Scrophulose ist wegen der grösseren Weichheit und des grösseren Blutreichthums der Wirbel bei Kindern bei diesen die Entzündung häufiger als bei Erwachsenen. Man hat dieselbe schon bei einigen alten Kindern beobachtet.

Bei Erwachsenen sind wegen der grösseren Consolidation der Wirbel und wegen ihres minder regeren Stoffwechsels schon bedeutendere Störungen nöthig, wenn eine Entzündung derselben statt finden soll.

Am häufigsten ist daher bei Erwachsenen Tuberkulose die Ursache, weil hierbei immer mehr oder weniger bedeutende Ernährungsstörungen vorhanden sind.

Symptome und Verlauf. Wegen der eigenthümlichen Anknüpfung zwischen den beiden ersten Halswirbeln der Halswirbelsäule und mit dem Hinterhaupt, wird das Krankheitsbild an dieser Stelle Eigenthümlichkeiten haben; Ebenso kann die Erkrankung des letzten Lendenwirbel und des Kreuzbeins wegen ihrer Beziehung zu den Geburtswegen besondere Veränderungen hervorrufen und beide Arten sollen deshalb für sich abgehandelt werden.

Die Erkrankung der übrigen Wirbel aber wollen wir zusammenfassen und dann die den einzelnen Wirbelparthien gemeinsamen Eigenthümlichkeiten am Ende erwähnen.

Die zuerst auftretenden Erscheinungen sind so unstimmtlicher Art, dass man von ihnen nur selten einen sicheren Schluss auf die eigenthümliche Natur der Erkrankung ziehen kann. In sehr seltenen Fällen, wo die Erkrankung mehr acuter Weise auftritt, wird dieselbe mit Fiebererscheinungen eingeleitet, fast immer aber ist der Anfang so scheinend chronisch, dass dieselben ganz fehlen, und dann werden die Erscheinungen der in Mitleidenschaft gezogenen Nerven den Anfang des Krankheitsbildes.

Da die vom Rückenmark austretenden Nerven am unmittelbarsten mit den Wirbeln in Berührung kommen, so ist es erklärlich, dass diese zuerst und zwar durch Uebertragung der Entzündung auf ihre Scheiden, irritirt werden, und Reizungserscheinungen in den von diesen versorgten Körpertheilen zuerst auftreten.

Diese Erscheinungen sind: Gefühl von Schwäche in den Armen, oder wenn der Sitz der Krankheit tiefer ist in den Beinen, dazu gesellt sich öfteres Einschlafen, Taubheit, Ameisenkriechen; Gefühl von Schwere, subjektives Kältegefühl und zuweilen leichte convulsivische Zuckungen. Zugleich mit diesen Erscheinungen treten dann gewöhnlich stechende und ziehende Schmerzen auf, welche sich indessen an keinem bestimmten Körpertheile localisiren, sondern bald hier, bald dort auftreten, besonders aber im Verlaufe der Wirbelsäule.

An der erkrankten Stelle fehlt in den ersten Stadien gewöhnlich der Schmerz, wenn die Entzündung nicht eine peripherische ist, wobei, wie schon gesagt wurde, starke Schmerzhaftigkeit von vornherein Regel ist. In den späteren Stadien fehlt derselbe nie, tritt aber bald früher bald später auf.

Zu den erwähnten Symptomen gesellt sich dann noch eine eigenthümliche allgemeine Schwäche, die Kranken fühlen sich unfähig zu jeder Arbeit, und haben öfter das Gefühl als wenn ihnen ein Reif um Brust resp. Bauch gezogen wäre. Auch neuralgische Affectionen in den verschiedenen andern Organen kommen dazu, so erschwertes Athmen, Husten, Herzklopfen oder Verdauungsbeschwerden.

hen kann auf diese Weise ein vollständiges Bild der
erie entstehen.

Alle diese zuletzt angegebenen Erscheinungen beru-
edenfalls darauf, dass die in Mitleidenschaft gezoge-
Nerven die Irritation auf Rückenmark- und Sympathicus
epflanzt haben, ohne dass diese Gebilde direkt von der
indung betroffen sind. Treten diese Zufälle bei tuber-
en oder scrophulösen Individuen auf, so muss vor allen
genaue Untersuchung der Wirbelsäule vorgenommen
en, denn nur die Veränderungen an dieser können
iner sichern Diagnose führen.

Schwieriger noch macht sich die Sache bei kleinen
ern, welche nicht im Stande sind ihren Gefühlen den
gen Ausdruck zu geben, bei diesen ist das bei Erwach-
n geschilderte Bild ungefähr folgendes:

Das Kind ist verstimmt, grillig, schreit oft ohne nach-
bare Ursache, wird ungeschickt in allen seinen Bewe-
en. Hat das Kind schon Gehen gelernt, so wird der
sehr wacklig, es strengt sich offenbar dabei an und
vielen Fällen gar nicht mehr zum Gehen zu bringen.
ie erkrankte Stelle ziemlich oben, so zieht es den Kopf
ek und zwischen die Schultern, um so mehr, je weiter
oben der Sitz der Krankheit ist. Schmerz an der er-
kten Stelle fehlt meist, dagegen klagen die Kinder oft
Schmerz an den seitlichen Theilen der Brust oder in
Magengegend, welche besonders bei unvorhergesehenen
egungen bei einem Stoss oder Schlag oder bei Bewe-
im Traume zunehmen, so dass sie oft laut dabei auf-
ien. Hierzu gesellt sich dann noch gewöhnlich er-
erte Respiration, unwillkürliches Abgehen des Koths
des Urins.

Sicher, wie schon gesagt, kann aus allen diesen Er-
nungen die Diagnose nicht gestellt werden, wenn nicht
neinungen der erkrankten Wirbel, vor allen Verkrüm-
g der Wirbelsäule nachgewiesen werden. Ehe diese je-
auftritt, entstehen gewöhnlich noch weitere Reizerschei-
en, welche sich wohl am besten dadurch erklären lassen,
durch entzündliche Ablagerungen das Rückenmark und
ustretenden Nerven noch mehr irritirt werden, es tre-

ten je nach dem höheren oder tieferen Sitz der Erkrankung an Armen oder Beinen heftige neuralgische Schmerzen auf, ja es können vollständige tonische Krämpfe besonders in den Beinen entstehen, und können hier als Contraktionen einzelner Muskelgruppen, so der Flexoren oder Adductoren oder als Rigidität sämtlicher Muskeln auftreten. Entzündung kann dann aber auf die Rückenmarkshäute übergelangen, wodurch die Zufälle der Reizung noch vermehrt werden, so dass gewöhnlich Krämpfe und Rigidität sämtlicher Muskeln entstehen, welche von unterhalb der erkrankten Stelle abgehenden Nerven versorgt werden.

Wird das Rückenmark selbst ergriffen von der Entzündung und dessen Erweichung herbeigeführt; so ist von Empfindungs- und Bewegungslosigkeit sämtlicher unterhalb gelegener Theile die nothwendige Folge.

Um auch da, wo noch keine Verkrümmung der Wirbelsäule vorhanden, ist zu einer sichern Diagnose zu gelangen hat man verschiedene Mittel gesucht, den Schmerz einer bestimmten Stelle zu lokalisiren. Man suchte dies durch Erschütterung der Wirbelsäule zu bewirken und liess Kranken von einem Stuhl oder Tisch springen, oder indem man sie stark auf beide Schultern schlug. Im Anfang der Krankheit erreicht man hierdurch nur selten seinen Zweck und in spätern Stadien kann der Versuch sehr gefährlich werden. Ungefährlicher und sicherer ist der von Copeland angegebene Versuch, welcher sich auf die grössere Reizbarkeit der an der erkrankten Stelle austretenden Nerven gründet. Dieser besteht darin, dass man mit einem heissen Schwamm längs der Wirbelsäule herfährt, wobei denn der Patient an der erkrankten Stelle Schmerz empfinden soll.

Es sind noch mehrere solcher Versuche angegeben, sind aber, da sie auf demselben Princip beruhen, nicht sicherer, sondern nur unbequemer.

Auf die vorhin geschilderten Reizerscheinungen folgen dann unter Umständen eine anscheinende Besserung; aber bald früher, bald später, treten an der erkrankten Stelle Schmerzen auf, welche nach und nach sehr heftig werden, bei Bewegungen der Wirbelsäule bedeutend zunehmen, dann auch bei absoluter Ruhe nicht fehlen. In manchen Fällen

diese Schmerzen oft gänzlich, während schon die Kyphose sich ausgebildet hat.

In diesem Stadium treten dann gewöhnlich die ersten Einbucnungen der Verkrümmung auf. Zuerst stehen gewöhnlich nur 2 proc. spin. etwas weiter auseinander. Ist die Krümmung aber schon weiter vorgeschritten, so ragen ein oder mehrere proc. spin. je nach der mehr oder weniger spitzwinkligen Krümmung der Wirbelsäule schwächer oder stärker vor. Ist noch gar nichts zu bemerken, so kann man oft hervortreten eines oder mehrerer proc. spin. an der ersten Stelle dadurch bewirken, dass man den Kranken eine vornüber gebeugte Stellung einnehmen lässt.

Bei einer ganz leichten kyphotischen Verkrümmung der Rückenwirbel braucht indess noch keine cariöse Zerstörung der Wirbelkörper vorhanden zu sein, sondern dieselbe kann nur eine Erweichung der Bänder entstanden sein, indem durch die normale Krümmung der Rückenwirbelsäule mit ihrer Convexität verstärkt wird. Dies soll nach Wernher in nicht seltenen Fällen von Wirbelentzündung öfter vorkommen.

Bei höheren Graden von Verkrümmung hat dieselbe einen ganz andern Grund.

Bei der cariösen Zerstörung bleiben die Wirbelbögen mit den proc. transv. und spinos. mit äusserst wenigen Ausnahmen stets verschont; wenn daher ein oder mehrere Wirbelkörper mit den Zwischenbandscheiben theilweise ganz zerstört sind, so muss durch den Druck von oben die Wirbelsäule nach vorn zusammensinken und eine kyphotische Ausbuchtung bilden. Diese Art von Verkrümmung wurde nach Percival Pott, welcher sie zuerst genauer beschrieben, auch Pott'scher Buckel genannt; je nachdem ein oder mehrere Wirbel theilweise oder ganz zerstört sind, ist die Krümmung eine mehr oder weniger spitzwinkelige. Ist der Kranke durch die übrigen Krankheitserscheinungen im Bett gebunden gewesen, so hat sich wegen des fehlenden Drucks von oben eine Verkrümmung nicht ausbilden können. Bei dem Rückenwirbel tritt die Verkrümmung am leichtesten auf, weil an diesen schon eine physiologische Convexität mit vorderer Concavität vorhanden ist. Bei den Halswirbeln ist dieses aber umgekehrt; bei diesen muss

also eine gerade Richtung schon als wichtiges Symptom gesehen werden.

Hiermit zugleich treten dann auch die Erscheinungen der verminderten Tragfähigkeit der Wirbelsäule hervor. Langes Stehen, Gehen fällt den Kranken sehr schwer. Beim Gehen suchen sie die mangelnde Stütze durch Auflegen der Hände auf die Hüften zu ersetzen, und auch beim Sitzen suchen sie nach einem Gegenstande, an dem sie den Oberkörper stützen können.

Wegen des jetzt bedeutender werdenden Schmerzes an der erkrankten Stelle suchen die Kranken jede Bewegung der Wirbelsäule sehr ängstlich zu vermeiden. Dies tritt besonders hervor, wenn man sie etwas von der Erde aufheben lässt; wobei dieselben mit gestrecktem Oberkörper durch Beugung der Kniee mit den Händen den Erdboden zu erreichen suchen.

Die neuralgischen Erscheinungen nehmen nunmehr den Charakter der Parese und Paralyse an.

Da die motorischen Nerven der Blasen nach Buckner durch das ganze Rückenmark verlaufen, so können an der Stelle der Wirbelsäule auftretende Erkrankungen Harnverhaltung zur Folge haben.

Hat die Caries die tieferen Wirbel betroffen, so können auch die sensiblen Nerven der Blase in Mitleidenschaft gezogen werden, und so die Füllung der Blase nicht zum Bewusstsein kommt, so wird das Uebel dadurch um so schlimmer. Die nothwendige Folge ist Alcalescenz des Urins und dadurch bedingter Blasencatarrh.

In weit selteneren Fällen wird durch Lähmung des Sphincter vesicae Inkontinenz des Urins herbeigeführt. Auch bedeutende Unterleibsstörungen treten auf, indem theils durch Mitleidenschaft des Sympathicus die peristaltischen Bewegungen des Darmcanals, theils durch Innervationen der Bauchmuskeln die Bauchpresse beeinträchtigt werden, wodurch Meteorismus und Verstopfung die nothwendigen Folgen sind.

Ferner tritt dann auch gewöhnlich Lähmung, je nachdem der Sitz der Krankheit in den untern oder obern Extremitäten ein, sie werden kalt, magern ab und sind unfähig

Bewegung. Da fast immer die vordern Stränge des Rückenmarks mehr leiden, so bleibt die Leitung für Extension gewöhnlich erhalten, nur in sehr seltenen Fällen ist sie umgekehrt. Die Reflexthätigkeit wird dabei in den ganzen Extremitäten nicht nur erhalten, sondern gewöhnlich vermehrt.

Früher leitete man alle Nervenzufälle von der Verwundung der Wirbelsäule her; allein dies ist wohl nicht richtig, denn selbst bei sehr starker Verkrümmung wird der Wirbelkanal fast nie verkleinert.

Auch würde eine geringe Verkrümmung nicht schaden, da das Rückenmark den Canal bei weitem nicht ausfüllt. Ferner müssten aber auch sämtliche Körpertheile, welche das Rückenmark unter der erkrankten Stelle versorgt werden, Innervationsstörungen leiden, dies ist aber keineswegs der Fall, und wenn es der Fall ist, so ist es fast immer von Entzündung des Rückenmarks oder seiner Häute zu leiten. Für die theilweisen Innervationsstörungen liegt der Grund jedenfalls in Entzündungsprodukten, welche das Rückenmark oder die austretenden Nerven drücken, denn oft sehen wir diese Innervationsstörungen nach Anwendung starker Antiphlogistia weichen. Ebenso pflegen sie zu schwinden, wenn sich Congestionsabscesse bilden anfangen, wobei dann durch die Senkung des Kopfes der Druck geringer wird.

Die Bildung von Congestionsabscessen ist bei Caries der Wirbel nicht nothwendig, da die Krankheit ohne Eiterung verlaufen kann, und selbst in den Fällen, wo sich Eiter bildet, kann derselbe, ehe es zur Bildung von Congestionsabscessen kommt, eingedickt oder resorbirt werden.

Wenn sich aber Congestionsabscesse bilden, so ist dies zu keiner bestimmten Periode der Krankheit der Fall. In manchen Fällen treten dieselben lange vor der Verkrümmung, in andern Fällen die Verkrümmung lange vor den Congestionsabscessen auf.

Die Bildung der Abscesse kommt auf folgende Weise zu Stande. Der gebildete Eiter sammelt sich in einem Eitersack, welcher durch die Entzündung der Umgebung entsteht. Mit diesem Sacke senkt sich der Eiter nach

aussen und unten und zwar meistens auf einem durch anatomische Verhältnisse vorgeschriebenem Wege.

Wernher giebt diesen Weg in folgender Weise an: Eiter muss, da die Wirbel vorn und hinten von dem betreffenden Bandapparat umschlossen sind, seinen Weg durch die Foram. intervertebral. nehmen. Hier senkt er sich in einen trichterförmigen Raum, welcher durch Uebertritt des Periosts und der dura mater auf die Nerven zwischen die beiden Membranen gebildet wird, erweitert diesen mehr und senkt sich dann im Verlaufe der betreffenden Nerven. Dies kann indessen nur bei centraler Caries der Fall sein, welche nicht nach Aussen durchgebrochen ist. War aber peripherische Caries vom Bandapparate ausgegangen, dann kann der Eiter nicht in diese Nervenscheide gelangen, dess auch in solchen Fällen senkt er sich nach gewissen Regeln.

Die Abscesse der Rückenwirbel haben den längsten Verlauf. Sie folgen meist dem Lauf der Aorta, dann der Iliaca communis und kommen so unter dem Lig. Poupart. zur Psoasabscesse zum Vorschein, unter Umständen können sie sich auch unter der Haut bis zum Knie senken. Selten senkt sich der Abscess nach hinten und kommt am Rücken zum Vorschein, in den seltensten Fällen bricht er nach der Brust- oder der Bauchhöhle durch. Bricht der entstandene Abscess auf, oder wird er, was noch weit schlimmer, von einer unvorsichtigen Hand geöffnet, so strömt, besonders im letztern Falle eine grosse Menge Eiter aus; dann schliesst sich allerdings die Oeffnung wieder, allein bald bricht der Eiter wieder in einer grösseren Menge da und wird wieder geöffnet, so erfolgt die Ansammlung in immer kleineren Zwischenräumen. Der Eiter wird dann immer schlechter, wässriger, jauchiger, die Kranken kommen immer mehr herunter, und es treten die durch Erschöpfung bedingten Allgemeinerscheinungen in den Vordergrund. Es stellt sich Fieber ein, welches mehr und mehr einen remittirenden Typus und den Character der Febris hectica annimmt; so pflegt unter allmählicher Verschlechterung des Eiters der Tod zu erfolgen. In der letzten Zeit wird die Haut an der erkrankten Stelle gewöhnlich geröthet, ödematös und br

Die Eitermenge wird dann oft geringer, doch ist dies natürlich als kein günstiges Zeichen mehr anzusehn. Der letale Ausgang kann nun noch durch verschiedene cutive Erkrankungen befördert werden; es kann sich Eitritus, morbus Brightii amyloide Degeneration der Leber, Nieren und Milz ausbilden. Seltener wird der Tod durch vollständige Compression des Rückenmarks in seinen oberen Theilen oder durch Durchbruch des Eiters in Brust- oder Bauchhöhle oder nach einem grösseren Gefässe und durch bedingte Blutung plötzlich herbeigeführt.

Wir wollen nun noch einige Eigenthümlichkeiten bezeichnen, welche die Caries der Wirbelsäule an einzelnen anderen Stellen darbietet. Dies ist besonders der Fall bei den beiden obersten Halswirbeln, welche wir, wie schon bemerkt, unter allen Umständen mit dem Namen der Spontaneum trocace belegen können.

Die Erscheinungen, welche hierbei durch Störungen der Innervation auftreten, sind sehr bedeutend, weil sämmtliche Rückenmarksnerven diese Stelle passiren müssen. Die Erscheinungen gleichen daher oft sehr denen der Spontaneum trocace.

Ist die Erkrankung bei Kindern, so sind diese gewöhnlich sehr aufgereggt, die Gesichtsmuskeln sind in fortwährender Action, die Augen werden hin und her gerollt und häufig stellen sich vollständige Krämpfe der Gesichtsmuskeln ein. Früher als bei Erkrankung der andern Wirbeln stellen sich Schmerzen an der erkrankten Stelle ein, welche mit dem Druck oder besonders bei Bewegung zunehmen. Die Kranken halten desshalb den Kopf ganz steif, oft allerdings ohne reflectorische Thätigkeit der Muskeln nach einer Seite abgelenkt, gewöhnlich nach der rechten, was Stromeier dahin erklärt, dass an dieser Seite die Muskeln stärker entwickelt sind, und die Reflexerscheinungen bei Gelenkentzündungen immer die grössere Muskelmasse in Anspannung versetzen.

Der Kopf kann nur mit grossem Schmerze bewegt werden, wollen ihn die Kranken drehen, so müssen sie den ganzen Körper mit zu Hülfe nehmen. Wird das Uebel vernachlässigt, so breiten sich die Schmer-

zen weiter aus auf Hinterhaupt, Stirn und Gesicht, die Kranken haben oft das Gefühl als ob ihnen ein Reif um Kopf oder Hals gezogen wäre, Schling und Athembeschwerden gesellen sich dazu. Sobald die Kranken den Kopf drehen versuchen, treten besonders, wenn die Bewegung eine unwillkührliche war, furchtbare convulsivische Krämpfe ein, der Kranke sucht daher fortwährend mit den Händen den Kopf zu unterstützen und alle Bewegungen desselben zu vermeiden. Anschwellung der Wirbel ist hinten selbster öfter an der hintern Pharynxwand zu bemerken. Kommt es zur Bildung von Congestionsabscessen so können diese Retropharyngalabscesse ausbilden (Angina Hippocratis) und der Eiter folgt den langen Halsmuskeln und kommt an der Seite des Halses oberhalb des Schlüsselbeins zum Vorschein.

Der letale Ausgang ist bei dieser Form am häufigsten, er kann auf sehr verschiedene Weise erfolgen, durch Consumtion der Kräfte, wie vorhin geschildert oder dadurch, dass durch Erschlaffung oder Vereiterung des Ligamentum paratus ligamentosus der processus odontoideus luxirt wird wodurch ein Druck auf die medulla oblongata plötzlich Aufhören der Respiration und Tod bedingt. Diese Compression der medulla oblongata kann auch allmählich erfolgen. Dann tritt Lähmung des ganzen Körpers bis auf Kopf und die innern Organe ein, und der Patient kann nur einige Tage leben. Ferner kann sich die Entzündung auf die Hirnsäule fortpflanzen und so die Zufälle der Meningitis erzeugen, denen der Kranke gewöhnlich erliegt.

Die Erscheinungen der Caries in den mittlern und untern Halwirbeln haben ebenfalls das Eigenthümliche, dass die verlorene Stützfähigkeit der Wirbel sich nur auf den Kopf bezieht und daher die Kranken diesen mit den Händen zu unterstützen suchen. Die Innervationserscheinungen beziehen sich nur auf die Arme und haben das Eigenthümliche, dass hier mehr die Symptome der Lähmung auftreten während bei Erkrankung der untern Rücken- und der Lendenwirbel in den untern Extremitäten vorherrschend Contracturen beobachtet werden.

Die Congestionsabscesse folgen entweder dem La

plex. brachial. und sammeln sich in der Achselhöhle können auch hinter dem Oesophagus in den hintern Hohlraum gelegen.

Dass bei cariöser Zerstörung der Rückenwirbel sich eine Kyphose ausbildet, während bei den Lendenwirbeln erst eine gerade Richtung der Wirbelsäule erfolgt, ist gesagt, doch sollen bei fortschreitendem Uebel die Krümmungen an der Lendenwirbelsäule stärker werden als an Rückenwirbeln, weil hier die Rippen einen bedeutenden Widerstand leisten. Indess ist dieser Widerstand nicht stark, bei stärkerer Verkrümmung folgen die Rippen nach und der Thorax ist gezwungen sich nach vorn zu dehnen, so dass auch vorn ein Buckel entsteht.

Die Erscheinungen der Caries am Kreuzbein, wobei ähnlich ein oder mehrere Lendenwirbel mit ergriffen werden, sind dann der Erkrankung der Rücken- und oberen Lendenwirbel sehr ähnlich. Der Congestionsabscesse können verschiedene Wege eingeschlagen: es können Psoasabscesse entstehen, der Eiter kann sich aber auch in der Gegend des Beckens ansammeln und Abscesse in der Umgebung des Mastdarms oder der Scheide erzeugen, er kann durch den Schleimbeutel unter dem Iliopsoas in Communication treten und wenn dieser wiederum mit dem Hüftgelenk in Communication tritt, in dieses eindringen.

Die Caries des Kreuzbeines gewinnt dadurch noch eine andere Bedeutung, dass durch sie eine Beckenanomalie erzeugt werden kann, welche allerdings selten vorkommt, für die Geburtswege von grosser Bedeutung ist, durch Zerstörung der Zwischenbandscheibe zwischen Kreuzbein und Lendenwirbel und der Körper des oberen Kreuz- und des unteren Lendenwirbels kann in dem Fall, dass die Zerstörung auf die proc. obliq. und auf die Bögen nebst den s. spinos. und transvers. übergeht, eine Verschiebung der Lendenwirbel vor das Kreuzbein und so ein spondyloides Becken entstehen. Diese Zerstörung der Bögen nebst den betreffenden Fortsätzen ist in diesem Fall halb leichter, weil das Kreuzbein ziemlich unbeweglich mit dem Becken vereinigt ist und sich daher nur schwer eine kyphotische Krümmung ausbilden kann, da der Kreuz-

beinkörper den sich senkenden Lendenwirbelkörpern entgegenkommen kann, was bei den übrigen Wirbeln Fall ist, wodurch dann wieder eine Aufeinanderlagerung der Wirbelkörper und dadurch vermehrte Stützfähigkeit der Wirbelsäule zu Stande kommt. Hier jedoch haben also die Bögen nebst den betreffenden Fortsätzen die ganze Last fast allein zu tragen, welche gerade hier die des ganzen Oberkörpers ist, wodurch das Fortschreiten der Zerstörung auf diese Theile entschieden befördert wird.

Ist aber die Verbindung des proc. obliq. und der Bogen durch die Zerstörung erst unterbrochen, so steht das Herabsinken der Lendenwirbel auf der durch Zerstörung des ersten Kreuzbeinkörpers entstandenen schiefen Ebene nichts entgegen.

Dass diese Veränderungen in dieser Weise vor sich gehen können, was von vielen bestritten wird, wird deutlich durch ein Becken bewiesen, welches sich in der Sammlung des Herrn Geheimrath Blasius befindet. Die Beschreibung dieses Beckens welche mir durch die Güte des Herrn Geheimraths erlaubt wurde, lasse ich mit der Abbildung der erkrankten Wirbel unten folgen.

Die Ausgänge der Wirbelcaries können sich sehr verschieden je nach den erkrankten Wirbeln und je nach dem Stadium, in welchem die Krankheit zum Stillstand kommt, sehr verschieden gestalten. Kommt die Krankheit früh zur Behandlung, so kann der Ausgang vollständige Genesung sein; allerdings mit Zurücklassung einer kleinen Differtät, welche aber durch Compensationskrümmungen so ausgeglichen wird, dass man sie durch die Kleider nicht bemerkt. Die Heilung kommt dadurch zu Stande, dass die Lücke, welche durch die Zerstörung gebildet war, durch Knickung der Wirbelsäule ausgeglichen wird, die erkrankten Wirbel verwachsen miteinander, es entsteht eine Anheilelose welche durch Knochenneubildung in der Umgebung noch verstärkt wird. Eine Ausfüllung der Lücke mit neuer Knochenmasse kommt nicht vor. Wenn durch horizontale Lage der Knickung vorgebeugt wird, so bildet sich im Laufe der Heilung in der Lücke wohl narbiges Bindegewebe, allein dies verknöchert nicht, sondern führt durch Contra-

träglich doch einen Buckel herbei. Die bindengewebige verschwindet durch Druck nach und nach ganz und tritt eine knöcherne Verbindung der genäherten Knochenflächen ein, welche ebenfalls durch Osteophyten gesichert wird.

Hat sich Eiter gebildet, so ist der Ausgang meist nicht günstig; indess kann es vorkommen, dass die Heilung erfolgt, noch ehe der Eiter nach Aussen entleert wird. Der Abscess wird dann resorbirt oder wenigstens eingedickt oder eintrocknet.

Ferner kann die Heilung mit Hinterlassung verschiedener Nachkrankheiten eintreten. So ist es möglich, dass der Eiter erst durchbricht, während die Heilung der Caries noch vor sich geht. In diesem Fall kann die Heilung vollständig zu Stande kommen und nur der Congestionsabscess zurückbleiben, es wird dann oft durch abgestossene nekrotische Knochenstückchen die Eiterung noch Jahrelang unterhalten. Es ist daher viel günstiger, wenn der Aufbruch möglichst wie möglich erfolgt, je später, desto sicherer ist die Heilung; man hat unterdess Zeit, die Constitution des Kranken zu verbessern, die Caries zur Heilung zu bringen und dann ist der Abscess kein gefährliches Uebel mehr.

Aber auch andere Störungen können zurückbleiben. Eine stärkere Krümmung, Verunstaltung, Druck auf die Lunge und dadurch bedingte Stockungen im venösen System. Die oben beschriebene Veränderung des Beckens gehört zu diesen Folgen.

Ferner können nervöse Störungen zurückbleiben, da diese meist durch entzündliche Exsudationen herbeigeführt werden, so kann die vollständige Heilung nur dann erfolgen, wenn diese resorbirbar sind, sind sie dies nicht, so müssen notwendig Lähmungen der betreffenden Extremitäten, der Harnblase, des Mastdarmes zurückbleiben; ebenso wenn dieselben durch Verkrümmung der Wirbelsäule und dadurch bedingte Compression des Rückenmarks herbeigeführt sind.

Endlich kann letaler Ausgang eintreten in der verwerflichsten Weise wie schon oben geschildert worden ist.

Diagnose. Die richtige Erkenntniss der Krankheit ist oft nicht ganz leicht, ehe die Verkrümmung der Wirbelsäule sich hinzugesellt hat. Die zuerst auftretenden Symptome können mit Neuralgien und Muskelrheumatismus verwechselt werden. Indess schützen hiervor die durch frühzeitiges Mitleiden des Rückenmarks und Sympathicus bedingten neuralgischen Erscheinungen in andern entfernten Organen. Auch Verwechselung mit Myelitis kann kommen, doch treten hierbei von vorn herein heftigere Nervensymptome auf. Bei Neubildungen der Wirbelsäule treten Erscheinungen auch einige Aehnlichkeit mit denen Wirbelcaries haben können, sind gleich im Anfang heftige Schmerzen vorhanden, auch haben dieselben einen raschen Verlauf. Vor Verwechselung mit rachytischer Krümmung, schützt die Form der Krümmung, die Anamnese, Nervenerscheinungen.

Ob ein Abscess in der Leistengegend durch Caries eines Wirbel, oder durch irgend eine andere Erkrankung entstanden, kann auf den ersten Blick auch nicht immer beurtheilt werden. Eiteransammlungen können an dieser Stelle nach Vereiterungen in der Umgebung der Nieren, an der rechten Seite nach Peritiphitis, ferner nach Hüftgelenkentzündungen, von Drüsenvereiterungen eintreten, zur Unterscheidung müssen dann die jedes dieser Uebel begleitenden Erscheinungen zu Rathe gezogen werden.

Gegen Verwechselung mit Brüchen schützt die Fluctuation, die Fluctuation der Abscesse das gurrende Geräusch beim Reponiren der Brüche.

Die Prognose richtet sich vor allen nach der zu Grunde liegenden Ursache, am günstigsten ist dieselbe bei Caries nach Trauma und Syphilis, ungünstiger nach Scrophulose. Die schlechteste Prognose ist bei Caries durch Tuberkulose zu stellen.

Dann nach dem Stadium, in welchem dieselbe zur Eiterung kömmt, je früher die Behandlung eintritt, desto mehr Aussicht ist natürlich auf mehr weniger vollständige Heilung.

Ferner nach dem Alter des Patienten. Bei Kindern ist die Prognose entschieden günstiger zu stellen. Hier

natürlich die constitutionellen Verhältnisse immer mit Auge zu fassen.

Endlich ist ein übler Ausgang um so mehr zu befürchten, je höher die erkrankte Stelle sich befindet. —

Die anatomische Untersuchung ergibt Folgendes: Hat die Erkrankung in den Zwischenbandscheiben begonnen, so findet man diese im Anfang der Krankheit erweicht, stark hyperämisch, verdickt, in späteren Stadien mehr oder weniger zerstört. Die Zerstörung ist dann gewöhnlich auch auf die benachbarten Wirbelkörper übergegangen. Beginn der Krankheit an den vorderen oder hinteren Lig. longitud. und dem Perioste so finden wir hier dieselben Veränderungen.

War dagegen eine centrale Wirbelentzündung vorhanden, so findet man in den meisten Fällen das spongiöse Gewebe des Knochens erweicht, hyperämisch, blutig infiltrirt, in seltensten Fällen ist dadurch der Umfang des Körpers etwas vermehrt. An einzelnen Stellen beginnt dann gewöhnlich die eiterige Schmelzung der entzündlichen Neubildung und schreitet nach Aussen fort, so dass ein Knochenabscess entsteht, welcher den Wirbel mehr und mehr zerstört. Hierbei kann nun aber auch an einzelnen Stellen innerhalb des Körpers sich Eiter bilden, welcher nicht nach Aussen durchbricht, in diesem Fall wird derselbe zu einer eitrigen Masse eingedickt, welche gewöhnlich von einem eitrigen Sacke entzündlicher Neubildung umschlossen wird. Solche Eiteransammlungen werden auch als eingekapselte Eiterherde beschrieben, sind aber eben nichts weiter, als verencapselter Eiter.

In andern Fällen findet man wirkliche Miliartuberkel, Anfangs aus grauen, später aus verkäsenden oder verflüssigten Knötchen bestehen, und durch ihren Zerfall Veränderungen des Wirbelkörpers veranlassen. Die durch Tuberkeln entstandenen Zerstörungen haben immer mehr oder weniger die Gestalt von Höhlen. Hierbei gehen die Zwischenbandscheiben natürlich auch mit zu Grunde, da ihnen die Nahrungszufuhr abgeschnitten wird.

Die cariöse Zerstörung betrifft wie schon erwähnt, fast immer nur den Körper des Wirbels. Die Bögen

und Fortsätze ebenso die Köpfchen der Rippen werden nur in den seltensten Fällen mit ergriffen. Die Zahl der kranken Wirbel ist verschieden, sie schwankt von einem bis sechs. Bei der dadurch entstehenden Knickung wird der Wirbelkanal fast nie verengt, die Wirbelsäule aber immer verkürzt.

Luxation der Wirbel wurde bis jetzt nur am Atlas beobachtet, dieser wird gewöhnlich nach vorn, selten nach der Seite luxirt.

Auch am letzten Lendenwirbel kann aber auch nach theilweiser Zerstörung der proc. obliq. Luxation entstehen wie es an dem später zu beschreibenden Becken der Fall ist.

Verletzungen des Rückenmarks, durch Compression der geknickten Wirbelsäule, oder durch hervorragende nekrotische Knochenstücke wird sehr selten beobachtet; dagegen findet man zuweilen die Residuen der Entzündung des Rückenmarks oder seiner Häute.

War die Caries mit Eiterung verbunden, so trifft man denselben in einem dicken fibrösen Sack eingehüllt neben der Wirbelsäule, wenn er sich aber schon gesenkt hat, so findet man von der erkrankten Stelle aus bis zum Congestionsabscess einen fibrösen Strang, in welchen ein fistulöser Gang die Verbindung zwischen Krankheitsheerd und Abscess unterhält. Nach der Heilung der Caries wird dieser Gang bald früh bald später geschlossen.

Durch die Psoasabscesse findet man diesen Muskel mehr oder weniger zerstört. Bei eintretender Heilung verwachsen die erkrankten einander zugekehrten Wirbelflächen knöchern mit einander, ausserdem aber entstehen an der Umgebung osteophytische Neubildungen, welche eine noch festere Verbindung der verwachsenen Wirbel vermitteln und oft so ausgedehnt sein können, dass sie die erkrankten Wirbel vollständig wie mit einem Knochenguss umgeben. Die Knochensubstanz der Wirbel selbst ist hierbei stets verhärtet und verdichtet.

Therapie. Gegen die Ursachen der Wirbelcaries muss, sobald dieselben im Körper des Patienten sich liegen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu Felde

werden. Liegt Tuberkulose zu Grunde, so ist allerdings nur leider wenig zu machen, mehr ist dies schon bei Phosphorose der Fall am günstigsten sind die Resultate bei Syphilis.

So lange Entzündung an der erkrankten Stelle vorhan-
st, sind Antiphlogistica, wie Blutegel, Schröpfköpfe, in-
leicht ableitende Mittel am Platze. Allgemeine Blut-
ziehungen sind deshalb entschieden zu vermeiden, da
Kranke alle seine Kräfte zur Heilung durchaus nöthig

Oertliche Ableitungen durch Blasenpflaster, Fontanel-
Aarseile, Moxen, Glüheisen sind erst dann am Platze,
alle Erscheinungen der Entzündung gewichen sind,
aber dann oft entschieden gute Dienste.

Wichtiger als diese Mittel ist die absolute Ruhe und
Aufhebung des Drucks der oberhalb erkrankten Stelle
liegenden Körperteile. Um beides zu erreichen ist dauernde
Lagerung am geeignetsten, und diese muss daher so-
Erscheinungen da sind, die auf Wirbelcaries deuten, so-
angewandt werden. Gewöhnlich genügt die Rücken-
in manchen Fällen jedoch, wo diese zu schmerzhaft,
bei Anwendung örtlicher Mittel zu hinderlich ist, muss
Kranke in die Bauchlage gebracht werden.

Gegen die eingetretene Verkrümmung lässt sich nichts
thun, nur in den allerleichtesten Fällen kann vielleicht
entsprechende orthopädische Behandlung etwas aus-
richten.

Gegen die Nervenaffectionen braucht keine Behandlung
angewandt zu werden, beruhen dieselben auf Entzündungs-
produkten, welche zurückgebildet werden können, so ver-
winden sie von selbst mit der Heilung, ist dies nicht der
Fall kann keine Therapie etwas machen.

Bei Lähmungen ist indessen die Anwendung der Elec-
tricität insofern von Nutzen, als sie die Atrophie der gelähm-
ten Theile aufhält, die Ernährung derselben verbessert und
Contractilität der Muskeln bis zu der unter den oben
angegebenen Umständen wieder möglichen Heilung erhält.

Ebenso kann bei Lähmung der Blase der Catheter, bei

Lähmungen des Mastdarms die Anwendung von leicht Abführmitteln nothwendig werden.

Unter allen Umständen muss für die Erhaltung Kräfte auf jede mögliche Weise, durch frische gesunde und gute kräftige leicht verdauliche Nahrung gesorgt werden.

Die Eröffnung der Congestionsabscesse ist unter allen Umständen so lange wie möglich aufzuschieben. Die Gefahr der Eröffnung liegt nicht in der dabei eintretenden Lähmung, denn diese kann auf geeignete Weise abgehalten werden, sondern in den veränderten Druckverhältnissen in der Umgebung des Abscesses, wodurch die Verschlechterung des Eiters herbeigeführt wird. Wie wesentlich diese Druckverhältnisse sind, kann man schon daraus ersehen, dass bei dem Herausfliessen des Eiters zuletzt immer Blut mit abfliesst, welches nur aus den Capillaren stammen kann, welche durch den veränderten Druck in den Wandungen des Abscesses zerrissen werden.

Hat sich ein Abscess geöffnet, so muss ganz besonders alle Aufmerksamkeit auf Erhaltung und Verbesserung der Kräfte gerichtet werden.

Alle zur Heilung des Knochenleidens angegebenen Mittel müssen bis zur vollständigen Heilung und noch eine Zeit lang darüber hinaus angewandt werden, da man nicht ganz sicher ist ob selbst beim Verschwinden aller Symptome der Krankheitsprozess im Innern wirklich Stillstand gemacht hat.

Ich lasse nun noch die Beschreibung des oben erwähnten Beckens nebst den Abbildungen folgen.

Dieses in der Sammlung des Herrn Geheimrath E. H. R. S. befindliche Becken, von welchem leider nur eine sehr kurze Notiz besagt dass dasselbe von einer Wilhelmine, 51 Jahr alt, herrührt, welche im Jahre 1862 an Lungentuberkulose starb. Seit 1861 hatte dieselbe Zeichen von Krokoxalgie gehabt, welche im Jahre 1862 mit Psaosabscess complicirt wurde. Ausserdem waren Abscesse in der Lumbalgegend zu fühlen gewesen.

Von dem Becken sind das Hüftbein und Kreuzbein ausserdem die Nachbartheile, die 4 untern Lendenwirbel und das obere Drittel des Femur erhalten, das Steissbein fehlt.

Form und Grösse des ganzen Beckens sowohl, wie der einzelnen Theile, sind im Allgemeinen normal, indess zeigten sämmtliche erhaltene Knochen beim Aufheben ein sehr geringes Gewicht, und haben hiermit übereinstimmend statt der normalen platten und festen Oberfläche grösstentheils fast gänzlich im kleinen Becken ein schwammig poröses fast einheitliches Aussehen und leicht zerbrechliche an einigen Stellen z. B. an der obern Parthie der crista sacralis eine Consistenz.

Besonders auffallend ist dies am Kreuzbein an den Lendenwirbeln, an der Tuberositas ossis ilium, weniger am Hüft- und Schambein. Die Darmbeinschaufeln sind an der Innenseite glatt; an der Aussenfläche mehr porös im Ganzen sind sie leicht, dünn und in der Mitte stark durchscheinend.

Ferner bemerkt man, dass der Schamwinkel auffallend klein ist und weit mehr dem eines männlichen, als eines weiblichen Beckens entspricht.

Das Kreuzbein ist an der vordern Seite sehr stark convex gewölbt besonders in der Gegend der Verbindung des 2ten und 3ten Kreuzbeinwirbels, ohne dass hier jedoch eine Knickung vorhanden wäre.

Am Kreuzbein befinden sich nun noch ausserdem folgende bedeutende pathologische Veränderungen. An der Verbindungsfläche der Basis des Kreuzbeins mit dem letzten Lendenwirbel hat eine umfangreiche Zerstörung des Beckens durch Caries statt gefunden, der vordere obere Winkel die obere und vordere Fläche des ersten Kreuzbeinkörpers sind vollständig zerstört, und statt dieser ist demselben nur eine raue abschüssige Fläche, welche vom hintern Rande der obern Fläche beginnt, und bis ca. 3" vom untern Rande der vordern Fläche endigt, vorhanden. Ebenso ist der rechte Gelenkfortsatz fast vollständig zerstört, der linke ist allerdings erhalten zeigt aber auch die Folgen des cariösen Processes. Dieser Zerstörung des Kreuzbeins entspricht nun ziemlich genau diejenige, welche dem letzten Lendenwirbel stattgefunden hat. Der untere hintere Winkel, die hintere und untere Fläche sind ebenfalls vollständig zerstört u. statt dieser ist eine der am Kreuzbein

beschriebenen correspondirende abschlüssige Fläche, welche sich vom obern Rande der hintern, bis ca. 2—3'' hinter vordern Rand der untern Fläche erstreckt, so dass der Körper dadurch vollständig die Gestalt eines Keils mit oberer Basis und unterer Schneide erhält. Fig. 2.

Der Wirbelbogen ist fast vollständig zerstört — Dornfortsatz fehlt ganz ebenso die beiden untern Gelenkfortsätze, die Querfortsätze sind zum Theil, die obern Gelenkfortsätze ziemlich vollständig erhalten, indessen ist rechte mit dem entsprechenden untern des 4ten Wirbels verlöthet, dass bei der Auseinandernahme der Wirbel nicht diese Verlöthung sich löste, sondern der proc. transv. seiner Basis durchbrach, und so proc. transv. und obliq. des 5ten Wirbels mit dem 4ten Wirbel im Zusammenhang blieb.

Der Bruch des proc. transvers. wurde allerdings durch bedeutend begünstigt, dass die Wurzel desselben fast vollständig zerstört war und die Continuität derselben nur durch zwei etwa linienstarke seitliche Spangen bewahrt wurde.

Der linke proc. transvers. nebst dem obern proc. obliquus befindet sich bis auf unbedeutende Defekte am 5ten Lendenwirbel.

An der obern Fläche des fünften Lendenwirbelkörpers und zwar an ihrem rechten Drittheil befindet sich ebenfalls ein ziemlich bedeutender Substanzverlust, aber nicht in der Weise, wie es soeben an der untern Fläche desselben Wirbels beschrieben wurde, sondern mehr in der Form einer nach vorn sich öffnenden Aushöhlung, welche durch die hintere untere Fläche des 4ten Lendenwirbels zu einem nach vorn offenen Canal geschlossen wird.

Ebenso sieht man an der vordern Fläche des 4ten Lendenwirbels und an den queren Gelenk- und Dornfortsätzen der übrigen noch erhaltenen Wirbel mehr weniger bedeutende Zerstörungen. Auch die übrigen Parthien des Kreuzbeins sind von der cariösen Zerstörung nicht verschont geblieben, besonders die superficies auricular. sinistra zeigt bedeutende Veränderungen; die ganze Fläche ist arrochirt, rauh, porös und in der Mitte gegen den hintern Rand so stark ausgehöhlt, dass die Höhle bequem das 1te G

raumens aufnimmt; mit dem canale sacral. communice indess nicht, sondern ist durch eine dünne poröse, Knochenschicht von diesem getrennt. Die entsprechende Fläche des Hüftbeins zeigt diese Zerstörungen in geringerem Grade, indess documentirt auch hier die obere Oberfläche nebst einigen unbedeutenden osteophytischen Auflagerungen den cariösen Process.

An der rechten Seite ist zwischen Kreuzbein und Hüftbein vollständige knöcherne Verwachsung eingetreten, sieht auch an dieser Seite ebenfalls besonders vorn die Residuen der cariösen Zerstörung, und ebenfalls aber geringe osteophytische Neubildungen.

Nicht weniger Veränderungen findet man an der vorderen Fläche des Kreuzbeins, die oberen for. sacral. sind bedeutend erweitert, ihre Wandungen schwammig, besonders die der rechten Seite; neben und etwas untern ist am 2ten Kreuzbeinkörper ausserdem noch eine grosse Aushöhlung des Knochens in Form und Grösse einer grossen Bohne. Die Verbindung zwischen 1sten und 2ten Kreuzbeinwirbel ist gelockert, und an der vorderen Fläche einen linienbreiten spaltförmigen Schlitz gekennzeichnet. Aehnlich verhalten sich die beiden oberen for. sacral. beide sind bedeutend erweitert, ihre Wandungen schwammig, rauh und neben dem linken ist eine cariöse Aushöhlung des Knochens mit eben solchen Wandungen.

Der Canal. sacral. ist erweitert mit den oberen foramen. durch sehr weite Communicationsöffnungen zusammenhängend, die vorderen und seitlichen Wände, sind theilweise zerstört, die hintern unterhalb des ersten Kreuzbeinwirbels durchbrochen.

Der unterste Theil des canal. sacral. ist durch schwammig-blättrige osteophytische Auflagerungen unwegsam geschlossen.

Bringt man nun den letzten Lendenwirbel in die Lage, die ihm durch den Krankheitsprocess angewiesen ist, so sieht man, dass die durch Zerstörung der hintern und untern Wand des Wirbelkörpers entstandene erwähnte abgewinkelte Fläche auf der correspondirenden des ersten Kreuzbeinwirbels ruht. Der Lendenwirbel liegt also nicht auf,

sondern vor dem ersten Kreuzbeinwirbel, und zwar so, daß die untern Ränder beider in einer Horizontalebene liegen, der untere Rand des Lendenwirbels den des Kreuzbeinwirbels aber um 3—4''' nach vorn überragt, so daß die stellvertretende Conjugata die Verbindungslinie zwischen obern Rande des 4ten Lendenwirbels, welche Stelle in diesem Fall dem Promontorium entspricht auch um mehrere Linien verkürzt ist (Vergleiche Fig. I.) Es ist also durch Caries der Wirbel und dadurch bedingte Verschiebung derselben jene Art von Becken entstanden, welche Kilian als spondylolisthetische beschrieb und welche Lambl. nur durch die Folgen von Hydrorachis entstehen läßt.

Durch Caries kann diese Form allerdings nur dann entstehen, wenn die proc. obliq. nebst dem Bogen des 5ten Lendenwirbels mit von der Zerstörung ergriffen werden, was selten genug vorkommt, daß es aber der Fall sein kann, zeigt dieser Fall sehr deutlich.

Statt der zerstörten normalen Gelenkverbindung zwischen den Gelenkfortsätzen des 5ten Lendenwirbels und des Kreuzbeins ist eine stellvertretende Gelenkverbindung zwischen der untern Fläche des theilweis zerstörten proc. transvers. des Lendenwirbels und den obern seitlichen Pathia des Kreuzbeins, dicht vor den Gelenkfortsätzen des Kreuzbeins hergestellt.

Der Anfang der Erkrankung war in diesem Fall, wegen des gleichzeitigen Befallenseins beider Verbindungen zwischen Darmbeinen und Kreuzbein und der, zwischen Kreuzbein und letztem Lendenwirbel jedenfalls in den Zwischenbandscheiben.

Der in diesem Fall wahrscheinlich nach Tuberkulose bedingte Process, griff von der Verbindung zwischen Kreuzbein und Lendenwirbel so rasch um sich, daß ehe es zur Bildung einer kyphotischen Ausbuchtung, und Verwachsung der erkrankten Knochenflächen kam, auch die beiderseitigen Gelenkfortsätze und die Bogen des 5ten Lendenwirbels zerstört wurden, und so in der, bei der Spondylarthrocace sacralis geschilderten Weise die Verschiebung der Lendenwirbel vor das Kreuzbein so weit vor sich ging, bis die noch theilweis erhaltenen proc. transvers. sich auf die seitlichen ob-

ieen des Kreuzbeins stützten, ein weiteres Herabsinken
nderten, und so die oben beschriebene Verbindung und
alt dieser Knochen bedingten. Ob es bei dieser Stellung
Theile zu einander geblieben wäre oder ob die schon
weis zerstörten proc. transvers. ganz zerstört wären und
in noch weiteres Herabsinken der Lendenwirbelsäule
stattfindrn können, lässt sich nicht entscheiden, der
angsprozess war entschieden schon eingeleitet, was durch
nöcherne Verwachsung des Kreuzbeins mit dem rech-
Darmbein, und des linken obern proc. oliqu. des 5ten
ewirbels mit dem entsprechenden des 4ten dokumentirt
das betreffende Individuum ging aber inzwischen durch
Tuberkulose oder an Erschöpfung durch die Caries, oder
n beide Ursachen znsammen zu Grunde.

Neben diesem cariösen Processe waren das Becken
alle Lendenwirbel ausserdem noch jedenfalls der Sitz
andern chronischen Entzündung, welche als Osteoma-
psatyra oder Halisteresis bekannt ist. Es sprechen
für der kleine Schamwinkel, das stark gekrümmte Kreuz-
, die poröse und zerbrechliche Beschaffenheit und das
ge Gewicht der Knochen. Ausserdem aber auch das
hältniss der gleich zu erwähnenden Beckendurchmesser.
e Osteomalacie war jedenfalls nur eine locale auf das
en und die benachbarten Wirbel beschränkte, wie sie
g in der Nähe cariöser Processe vorkömmt. Es spricht
für jedenfalls die ziemlich normale Beschaffenheit der
tenen obern Stücke des oss. femor.

Die beim Fehlen des oss. ³coccygis und der lig. tube-
u. spinoso sacra zu ermittelnden Durchmesser ergeben
ndes Verhältniss.

Die stellvertretende Coniugata, die Verbindungslinie
chen stellvertretenden Promontorium d. h. in diesem
dem obern vordern Rande des 5. Lendenwirbel und
obern Rande der Symphyse = 4".

Der richtige Querdurchmesser zwischen den vordern
en Darmbeinstacheln $9\frac{1}{2}$ ".

Der hintere Querdurchmesser, zwischen den am wei-
n von einander abstehenden Punkten der innern Lip-
der Darmbeinkämme $10\frac{1}{4}$ ".

Der Querdurchmesser zwischen den lineae arcuatae internae $5\frac{1}{4}$ ''.

Die beiden schrägen Durchmesser zwischen dem oberen Theil der Symph. sacroiliaca der einen und der Emin. ilipectinea der andern Seite $4\frac{3}{4}$ ''.

Gerader Durchmesser der Beckenweite, zwischen Mitte der Schamfuge und der Vereinigungsstelle des 2. 3. Kreuzbeinwirbels 5''.

Querdurchmesser der Beckenweite zwischen den Hüftpfannen 4''.

Gerader Durchmesser der Beckenenge zwischen untern Theil der Symphyse und der Kreuzbeinspitze 4''.

Querdurchmesser der Beckenge zwischen den tub. oss. ischii = $3\frac{1}{4}$ ''.

Die Conjugata Diagonalis d. h. die Verbindungslinie zwischen dem untern Theil der Symphyse und dem st. vertretenden Promontorium $4\frac{1}{2}$ ''.

Höhe des Beckens 7''.

Der Abstand der spinae oss. ilei post. sup. von d. proc. spinos. des 4. Lendenwirbels ist auf beiden Seiten gleich. Sämmtliche Durchmesser sind also mit Ausnahmen der Conjugata, des Querdurchmessers des Beckeneingangs, des Querdurchmessers der Beckenweite und der Beckenenge, welche sämmtlich zu klein, und des geraden Durchmesser der Beckenweite, welcher etwas zu gross ist normal d. h. sie stimmen am getrockneten Becken wie hier etwas grösser, als sie am frischen Becken, welches noch an den Weichtheilen verkleidet ist, angegeben sind.

Die Verkürzung der Conjugata ist bereits erklärt.

Die Verkürzung der andern oben angegebenen Durchmesser ist eine bei osteomalacischen Becken constante Erscheinung, die in Folge des gewöhnlich beiderseitigen zusammengedrücktwerdens des Beckens durch den Druck der Schenkelköpfe entsteht.

Die ziemlich bedeutende Vergrösserung des geraden Durchmessers der Beckenweite kann hier wohl nicht allein mit dem Eintrocknetsein der Beckenknochen erklärt werden. Es ist diese Verlängerung eben auch bei geringen Graden Osteomalacie constant und wird bedingt durch die bei

Krankheit vorkommende stärkere Wölbung des Kreuz- und der in Folge des seitlichen Zusammengedrückt- des Beckens entstandene Hervortreibung der Sym-

L e b e n s l a u f.

Am 2. Mai 1842 wurde ich, Johann Heinrich Kraus, zu er in Westfalen geboren. Mein jetzt verstorbener Vater war Arbeiter in Höxter. Meine Mutter Luise stammt ebenfalls aus Familie Kraus. Ich gehöre der evangelischen Religion an. Ostern 1857 bis 1858 besuchte ich das Gymnasium zu Her- von Ostern 1859 das Gymnasium zu Bielefeld, von da begab ich, nachdem ich das Abiturientenexamen bestanden hatte, n 1863 nach Halle, um mich dem Studium der Medicin zu en. Nachdem ich 5 Semester die Universität Halle besucht begab ich mich nach Würzburg, nachdem ich vorher in das Tentamen physicum bestanden hatte. In Würzburg ich 2 Semester kehrte dann nach Halle zurück, und bestand abt im November d. J. das Examen rigorosum.

In Halle besuchte ich während meines ersten Aufenthaltes Vorlesungen bei

Herrn Geheimrath Professor Volkmann.

„ „ „ Krahmer.

„ Prof. Knoblauch.

„ „ Heintz.

„ „ Welcker.

Herrn Dr. Schweigger-Seidel.

„ Prof. Giebel.

In Würzburg besuchte ich die Vorlesungen und Kliniken der

Herrn Hofrath Bamberger.

„ „ Linhardt.

„ „ Scanzoni.

„ Dr. Dehler.

„ „ Petzoldt.

Während meines 2ten Aufenthaltes in Halle Kliniken und esungen bei

Herrn Geheimrath Prof. Blasius.

„ Prof. Weber.

„ „ Olshausen.

„ „ R. Volkmann.

Nachdem ich nun das Tentamenphysicum und Examen osum vorschriftsmässig bestanden habe, hoffe ich durch meine ertation und Vertheidigung der aufgestellten Thesen die Doc- rde zu erlangen.

T h e s e n.

I.

Die Eröffnung eines Congestionsabscesses ist
lange wie möglich aufzuschieben.

II.

In der Geburtshilfe ist das Chloroform von
grössten Nutzen.

III.

Blutentziehung ist bei Pneumonie nur unter
gewissen Bedingungen zulässig.



Fig. 1.







Fig. 2.



Hicemox fer

